



Ambulant vor Stationär (AVOS) - Kriterien für eine stationäre Behandlung

(Version 1.3)

Im Kanton Basel-Stadt gültig ab 01. Januar 2021;

Im Kanton Basel-Landschaft gültig ab 01. März 2021

Allgemeine Erläuterungen zu den Kriterien

Die vorliegenden Kriterien wurden gemeinsam von Vertretern der Dienststelle Gesundheit und Sport Luzern, der Hirslanden Klinik St. Anna Luzern, der Luzerner Ärztesgesellschaft und des Luzerner Kantonsspitals erarbeitet und in Koordination mit den Kriterien des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) weiterentwickelt. Diese Kriterien werden laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Es soll vermieden werden, den Kriterienkatalog durch laufende Präzisierungen oder Detailregelungen übergross anwachsen zu lassen.

Bei Erfüllung eines der Kriterien verzichtet das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt auf eine weitergehende Prüfung der Wirtschaftlichkeit bei stationärer Durchführung. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass eine stationäre Durchführung in jedem Fall die wirtschaftlichste Massnahme ist oder dass eine ambulante Durchführung nicht möglich wäre. Die Kriterien dienen lediglich der administrativen Vereinfachung und stellen keine medizinische Empfehlung dar.

Daraus folgt, dass einerseits eine Patientin / ein Patient trotz erfülltem Kriterium ambulant behandelt werden kann. Andererseits kann es Gründe geben, dass eine Patientin / ein Patient ohne erfülltes Kriterium dennoch stationär behandelt werden muss. Diese können beim jeweiligen Eingriff im «Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung» dokumentiert werden.

Hier wurden für jeden einzelnen Eingriff der seit 01. Januar 2021 eingeführten «16er-AVOS-Liste» die Kriterien zusammengefasst unter Berücksichtigung folgender Elemente (vgl. auch Raster der ab 1. Januar 2021 gültigen «Kriterien für eine stationäre Behandlung»):

- Die «Allgemeinen Kriterien» (vgl. Tabelle Seite 2) entsprechen den generellen Schwellenwerten. Bei den einzelnen Eingriffen sind in den Tabellen dann gegebenenfalls spezifische Abweichungen von den generellen Schwellenwerten abgebildet. Diese Abweichungen können enger oder weiter gefasst sein als die «Allgemeinen Kriterien».
- «Eingriffsspezifische Kriterien» sind weitere, nur für den betreffenden Eingriff massgebende Ausnahmen. Diese gelten unabhängig von den «Allgemeinen Kriterien».
- Die Kriterien für die vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) in der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) definierten sechs Eingriffe («BAG-Liste») wurden soweit möglich integriert, respektive bei den jeweiligen Eingriffen aufgeführt. Im Zweifel gelten für die vom Bund definierten Eingriffe die Formulierungen der KLV.



Spital / Klinik			
Ärztin / Arzt	Name, Vorname	Patientin / Patient	Name, Vorname
	E-Mail-Adresse		Geburtsdatum
	Telefonnummer		Datums des Eingriffs
			Rechnungsnummer

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Allgemeine Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	--

0. Allgemeine, eingriffsunspezifische Kriterien

Feld zur Markierung eines zutreffenden Kriteriums

Alter (Geburtstag)	<input type="checkbox"/>	Unter 16 Jahre
	<input type="checkbox"/>	Über 75 Jahre
Fehlbildungen	<input type="checkbox"/>	Keine Anwendung bei durch den Kanton definierten Eingriffen.
Kardiale Erkrankungen	<input type="checkbox"/>	Herzinsuffizienz NYHA > II
	<input type="checkbox"/>	Unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)	<input type="checkbox"/>	OSAS mit AHI \geq 15/h und zuhause kein CPAP möglich
	<input type="checkbox"/>	COPD > GOLD II
	<input type="checkbox"/>	Asthma bronchiale instabil oder exazerbiert
Gerinnungsstörungen	<input type="checkbox"/>	Entgleiste Gerinnungsstörungen
	<input type="checkbox"/>	Therapeutische Antikoagulation
Blutverdünnung	<input type="checkbox"/>	Duale Tc-Aggregationshemmung
Neurologische Erkrankungen	<input type="checkbox"/>	Demenz resp. MMS \leq 26 Punkte, Uhrentest \leq 5 Punkte
Metabolische Erkrankungen	<input type="checkbox"/>	Diabetes mellitus mit BZ kap. perioperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8%
	<input type="checkbox"/>	Adipositas mit BMI \geq 40kg/qm; bei Kindern > 97. Perzentile
	<input type="checkbox"/>	Mangelernährung / Kachexie (BMI < 17.5, bei Kindern < 3. Perzentile)
Niereninsuffizienz	<input type="checkbox"/>	Kreatinin-Clearance nach Cockcroft < 30 ml/min(1)
Kontrastmittel-Allergie	<input type="checkbox"/>	Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium.
Psychische Störungen	<input type="checkbox"/>	Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen
Soziale Faktoren	<input type="checkbox"/>	Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ
	<input type="checkbox"/>	Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi
	<input type="checkbox"/>	Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h Notfall und entsprechender Disziplin

Legende:

- (1) Eine dialysepflichtige chronische Niereninsuffizienz Stadium 5 begründet für sich keinen stationären Aufenthalt.
- (2) **Bei Eingriff der BAG-Liste:** Medizinisches Kodierungshandbuch, Bundesamt für Statistik (BFS), Version 2020, Anhang: Mangelernährung, Definition Stadien der Mangelernährung bei Kindern. Einsehbar unter: www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Gesundheit > Grundlagen und Erhebungen > Nomenklaturen > Medizinische Kodierung und Klassifikationen > Instrumente zur medizinischen Kodierung > Kodierungshandbuch



Spital / Klinik		Patientin / Patient	
Name, Vorname	E-Mail-Adresse	Name, Vorname	Geburtsdatum
Telefonnummer		Datums des Eingriffs	Rechnungsnummer

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

1. Eingriffe am Auge

1.1. Katarakt

Kardiale Erkrankungen		Herzinsuffizienz NYHA > II
		Unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch
Pulmonale Erkrankungen (nur bei Allgemein- anästhesie)		OSAS mit AHI \geq 15/h und zuhause kein CPAP möglich
		COPD > GOLD II
		Asthma bronchiale instabil oder exazerbiert
Gerinnungsstörungen		Entgleiste Gerinnungsstörungen
Neurologische Erkrankungen		Demenz resp. MMS \leq 26 Punkte, Uhrentest \leq 5 Punkte
Metabolische Erkrankungen		Diabetes mellitus mit BZ kap. perioperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8%
		Mangelernährung / Kachexie (BMI < 17.5, bei Kindern < 3. Perzentile)
Niereninsuffizienz		Kreatinin-Clearance nach Cockcroft < 30 ml/min
Kontrastmittel-Allergie		Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium.
Psychische Störungen		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen
Soziale Faktoren		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ
		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi
		Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik			
Ärztin / Arzt	Name, Vorname	Patientin / Patient	Name, Vorname
	E-Mail-Adresse		Geburtsdatum
	Telefonnummer		Datums des Eingriffs
			Rechnungsnummer

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

2. Eingriffe am Bewegungsapparat

2.1. Handchirurgie

Kardiale Erkrankungen		Herzinsuffizienz NYHA > II
		Unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		OSAS mit AHI \geq 15/h und zuhause kein CPAP möglich
		COPD > GOLD II
		Asthma instabil oder exazerbiert
Gerinnungsstörungen		Entgleiste Gerinnungsstörungen
		Therapeutische Antikoagulation
Blutverdünnung		Duale Tc-Aggregationshemmung
Neurologische Erkrankungen		Demenz resp. MMS \leq 26 Punkte, Uhrentest \leq 5 Punkte
Metabolische Erkrankungen		Diabetes mellitus mit BZ kap. perioperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8%
		Mangelernährung / Kachexie (BMI < 17.5, bei Kindern < 3. Perzentile)
Niereninsuffizienz		Kreatinin-Clearance nach Cockcroft < 30 ml/min
Kontrastmittel-Allergie		Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium.
Psychische Störungen		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen
Soziale Faktoren		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ
		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi
		Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin
Eingriffsspezifische Kriterien		Drainage mit relevanter Fördermenge
		Gestielte Lappenplastiken
		OSME kombiniert an Radius und Ulna oder im proximalen Drittel des Arms
		Rezidiv-CTS
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik			
Ärztin / Arzt	Name, Vorname	Patientin / Patient	Name, Vorname
	E-Mail-Adresse	Geburtsdatum	
	Telefonnummer	Datums des Eingriffs	
		Rechnungsnummer	

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

2.2. Fusschirurgie exkl. Hallux valgus

Alter (Geburtstag)		Unter 16 oder über 75 Jahre
Kardiale Erkrankungen		Herzinsuffizienz NYHA > II
		Unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		OSAS mit AHI \geq 15/h und zuhause kein CPAP möglich
		COPD > GOLD II
		Asthma instabil oder exazerbiert
Gerinnungsstörungen		Entgleiste Gerinnungsstörungen
		Therapeutische Antikoagulation
Blutverdünnung		Duale Tc-Aggregationshemmung
Neurologische Erkrankungen		Demenz resp. MMS \leq 26 Punkte, Uhrentest \leq 5 Punkte
Metabolische Erkrankungen		Diabetes mellitus mit BZ kap. perioperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8%
		Adipositas (BMI \geq 40 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)
		Mangelernährung / Kachexie (BMI < 17.5, bei Kindern < 3. Perzentile)
Niereninsuffizienz		Kreatinin-Clearance nach Cockcroft < 30 ml/min
Kontrastmittelallergie		Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium.
Psychische Störungen		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen
Soziale Faktoren		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ
		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi
		Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin
Eingriffsspezifische Kriterien		Drainage mit relevanter Fördermenge
		Gestielte Lappenplastiken
		OSME bei komplizierten Gelenksfrakturen (Talus, Calcaneus, Pilon-Frakturen)
		\geq 3 Hammerzehenkorrekturen auf einer Seite und in einer Sitzung
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		Diabetischer Fuss mit Polyneuropathie



Spital / Klinik		Patientin / Patient	
Name, Vorname	E-Mail-Adresse	Name, Vorname	Geburtsdatum
Telefonnummer		Datums des Eingriffs	Rechnungsnummer

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

2.3. Osteosynthesematerialentfernungen (OSME)

Alter (Geburtstag)		Unter 16 oder über 75 Jahre
Kardiale Erkrankungen		Herzinsuffizienz NYHA > II
		Unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		OSAS mit AHI \geq 15/h und zuhause kein CPAP möglich
		COPD > GOLD II
		Asthma instabil oder exazerbiert
Gerinnungsstörungen		Entgleiste Gerinnungsstörungen
		Therapeutische Antikoagulation
Blutverdünnung		Duale Tc-Aggregationshemmung
Neurologische Erkrankungen		Demenz resp. MMS \leq 26 Punkte, Uhrentest \leq 5 Punkte
Metabolische Erkrankungen		Diabetes mellitus mit BZ kap. perioperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8%
		Adipositas (BMI \geq 40 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)
		Mangelernährung / Kachexie (BMI < 17.5, bei Kindern < 3. Perzentile)
Niereninsuffizienz		Kreatinin-Clearance nach Cockcroft < 30 ml/min
Kontrastmittelallergie		Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium.
Psychische Störungen		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen
Soziale Faktoren		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ
		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi
		Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin
Eingriffsspezifische Kriterien		Drainage mit relevanter Fördermenge
		OSME im Bereich Scapula, Rippen, Sternum
		OSME kombiniert an Radius und Ulna oder im proximalen Drittel des Arms
		OSME bei komplizierten Gelenksfrakturen (Talus, Calcaneus, Pilon-Frakturen) oder nach grossen Weichteilrekonstruktionen
		OSME von Marknägeln (nicht Spickdrähte!)
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik		Patientin / Patient	
Name, Vorname		Name, Vorname	
E-Mail-Adresse		Geburtsdatum	
Telefonnummer		Datums des Eingriffs	
		Rechnungsnummer	

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

2.4. Kniearthroskopien inkl. Eingriffe am Meniskus (Eingriff der BAG-Liste)

Alter (Geburtstag)		<i>Alter ≤ 3 Jahre Keine obere Alterslimite</i>
Fehlbildungen		<i>Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und / oder Atmungssystem</i>
Kardiale Erkrankungen		<i>Herzinsuffizienz NYHA > II Schwer einstellbare arterielle Hypertonie</i>
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		<i>OSAS mit $AHI \geq 15/h$ und zuhause kein CPAP möglich</i>
		<i>COPD > GOLD II</i>
		<i>Asthma instabil oder exazerbiert Langzeit-Sauerstofftherapie</i>
Gerinnungsstörungen		<i>Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen Therapeutische Antikoagulation</i>
Blutverdünnung		<i>Duale Tc-Aggregationshemmung</i>
Metabolische Erkrankungen		<i>Diabetes mellitus schwer einstellbar, instabil</i>
		<i>Adipositas (BMI ≥ 40 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)</i>
		<i>Erwachsene: BMI < 17.5; bei Kindern PYMS-Score ≥ 3 und Definition der Stadien der Mangelernährung gemäss Kodierungshandbuch (2) Schwere Stoffwechselstörungen</i>
Niereninsuffizienz		<i>CKD >3</i>
Psychische Störungen		<i>Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen</i>
		<i>Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen</i>
Soziale Faktoren		<i>Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ</i>
		<i>Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi</i>
		<i>Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin</i>
		<i>Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung Relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin / dem Patienten</i>
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik		Patientin / Patient	Name, Vorname	
Ärztin / Arzt	Name, Vorname		Geburtsdatum	
	E-Mail-Adresse		Datums des Eingriffs	
	Telefonnummer		Rechnungsnummer	

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

3. Kardiologie

3.1. Kardiologische Untersuchungsverfahren

Alter (Geburtstag)		Unter 16 oder über 75 Jahre
Kardiale Erkrankungen		EF < 40% und Herzinsuffizienz NYHA > II
		Unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		OSAS mit AHI ≥ 15/h und zuhause kein CPAP möglich
		COPD > GOLD II
		Asthma instabil oder exazerbiert
Gerinnungsstörungen		Entgleiste Gerinnungsstörungen
		Therapeutische Antikoagulation
Blutverdünnung		Triple-Therapie
Neurologische Erkrankungen		Demenz resp. MMS ≤ 26 Punkte, Uhrentest ≤ 5 Punkte
Metabolische Erkrankungen		Diabetes mellitus mit BZ kap. perioperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8%
		Adipositas (BMI > 35 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)
		Mangelernährung / Kachexie (BMI < 17.5, bei Kindern < 3. Perzentile)
Niereninsuffizienz		Kreatinin-Clearance nach Cockcroft < 60 ml/min (1)
Kontrastmittelallergie		Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium.
Psychische Störungen		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen
Soziale Faktoren		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im selben Haushalt
		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi
		Anfahrtszeit > 30 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik		Patientin / Patient	
Name, Vorname	E-Mail-Adresse	Name, Vorname	Geburtsdatum
Telefonnummer		Datums des Eingriffs	Rechnungsnummer

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

3.2. Herzschrittmacher inkl. Wechsel

Alter (Geburtstag)		Unter 16 oder über 75 Jahre
Kardiale Erkrankungen		Herzinsuffizienz NYHA > II
		Unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		OSAS mit AHI \geq 15/h und zuhause kein CPAP möglich
		COPD > GOLD II
		Asthma instabil oder exazerbiert
Gerinnungsstörungen		Entgleiste Gerinnungsstörungen
		Therapeutische Antikoagulation
Blutverdünnung		Duale Tc-Aggregationshemmung
Neurologische Erkrankungen		Demenz resp. MMS \leq 26 Punkte, Uhrentest \leq 5 Punkte
Metabolische Erkrankungen		Diabetes mellitus mit BZ kap. perioperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8%
		Adipositas (BMI \geq 40 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)
		Mangelernährung / Kachexie (BMI < 17.5, bei Kindern < 3. Perzentile)
Niereninsuffizienz		Kreatinin-Clearance nach Cockcroft < 60 ml/min (1)
Kontrastmittelallergie		Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium.
Psychische Störungen		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen
Soziale Faktoren		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im selben Haushalt
		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi
		Anfahrtszeit > 30 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin
Eingriffsspezifische Kriterien		Drainage mit relevanter Fördermenge
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik		Patientin / Patient	
Ärztin / Arzt	Name, Vorname	Name, Vorname	Geburtsdatum
	E-Mail-Adresse	Datums des Eingriffs	Rechnungsnummer
	Telefonnummer		

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

4. Eingriffe an Gefässen

4.1. Varizen der unteren Extremität (Eingriff der BAG-Liste)

Alter (Geburtstag)		<i>Alter ≤ 3 Jahre Keine obere Alterslimite</i>
Fehlbildungen		<i>Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und / oder Atmungssystem</i>
Kardiale Erkrankungen		<i>Herzinsuffizienz NYHA > II Schwer einstellbare arterielle Hypertonie</i>
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		<i>OSAS mit AHI ≥ 15/h und zuhause kein CPAP möglich</i>
		<i>COPD > GOLD II</i>
		<i>Asthma instabil oder exazerbiert Langzeit-Sauerstofftherapie</i>
Gerinnungsstörungen		<i>Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen Therapeutische Antikoagulation</i>
Blutverdünnung		<i>Duale Tc-Aggregationshemmung</i>
Metabolische Erkrankungen		<i>Diabetes mellitus schwer einstellbar, instabil</i>
		<i>Adipositas (BMI ≥ 40 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)</i>
		<i>Erwachsene: BMI < 17.5; bei Kindern PYMS-Score ≥ 3 und Definition der Stadien der Mangelernährung gemäss Kodierungshandbuch (2) Schwere Stoffwechselstörungen</i>
Niereninsuffizienz		<i>CKD >3</i>
Psychische Störungen		<i>Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen</i>
Soziale Faktoren		<i>Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ</i>
		<i>Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi</i>
		<i>Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin</i>
		<i>Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung Relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin / dem Patienten</i>
Eingriffsspezifische Kriterien		<i>Beidseitige Crossektomie</i>
		<i>Ein- oder beidseitige Crossrevision</i>
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik		Patientin / Patient	Name, Vorname	
Ärztin / Arzt	Name, Vorname		Geburtsdatum	
	E-Mail-Adresse		Datums des Eingriffs	
	Telefonnummer		Rechnungsnummer	

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

4.2. Perkutane transluminale Angioplastie (PTA) inkl. Ballondilatation

Alter (Geburtsstag)		Unter 16 oder über 75 Jahre
Kardiale Erkrankungen		Herzinsuffizienz NYHA > II
		Unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		OSAS mit AHI \geq 15/h und zuhause kein CPAP möglich
		COPD > GOLD II
		Asthma instabil oder exazerbiert
Gerinnungsstörungen		Entgleiste Gerinnungsstörungen
		Therapeutische Antikoagulation mit OAK, NOAK, Voll-Liqueminsierung (kumulativ)
Blutverdünnung		Triple-Therapie
Neurologische Erkrankungen		Demenz resp. MMS \leq 26 Punkte, Uhrentest \leq 5 Punkte
Metabolische Erkrankungen		Diabetes mellitus mit BZ kap. perioperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8%
		Adipositas (BMI > 35 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)
		Mangelernährung / Kachexie (BMI < 17.5, bei Kindern < 3. Perzentile)
Niereninsuffizienz		Kreatinin-Clearance nach Cockcroft < 60 ml/min (1)
Kontrastmittelallergie		Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium.
Psychische Störungen		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen
Soziale Faktoren		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im selben Haushalt
		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi
		Anfahrtszeit > 30 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin
Eingriffsspezifische Kriterien		Beidseitige Intervention mit beidseitiger Punktion
		Aorteneingriffe und Eingriffe an viszerale Gefässen
		St.n. Leisteneingriff bei Punktion in der Leiste
		Zugang mittels Schleuse > 6F
		Verschlussrekanalisation
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		Endovaskuläre Fremdkörperentfernung



Spital / Klinik		Patientin / Patient	
Name, Vorname	E-Mail-Adresse	Name, Vorname	Geburtsdatum
Telefonnummer		Datums des Eingriffs	Rechnungsnummer

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

5. Chirurgie

5.1. Hämorrhoiden (Eingriff der BAG-Liste)

Alter (Geburtstag)		<i>Alter ≤ 3 Jahre Keine obere Alterslimite</i>
Fehlbildungen		<i>Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und / oder Atmungssystem</i>
Kardiale Erkrankungen		<i>Herzinsuffizienz NYHA > II Schwer einstellbare arterielle Hypertonie</i>
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		<i>OSAS mit AHI ≥ 15/h und zuhause kein CPAP möglich</i>
		<i>COPD > GOLD II</i>
		<i>Asthma instabil oder exazerbiert Langzeit-Sauerstofftherapie</i>
Gerinnungsstörungen		<i>Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen</i>
		<i>Therapeutische Antikoagulation</i>
Blutverdünnung		<i>Duale Tc-Aggregationshemmung</i>
Metabolische Erkrankungen		<i>Diabetes mellitus schwer einstellbar, instabil</i>
		<i>Adipositas (BMI ≥ 40 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)</i>
		<i>Erwachsene: BMI < 17.5; bei Kindern PYMS-Score ≥ 3 und Definition der Stadien der Mangelernährung gemäss Kodierungshandbuch (2) Schwere Stoffwechselstörungen</i>
Niereninsuffizienz		<i>CKD > 3</i>
Psychische Störungen		<i>Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen</i>
		<i>Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen</i>
Soziale Faktoren		<i>Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ</i>
		<i>Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi</i>
		<i>Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin</i>
		<i>Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung Relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin / dem Patienten</i>
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik		Patientin / Patient	
Name, Vorname	E-Mail-Adresse	Name, Vorname	Geburtsdatum
Telefonnummer		Datums des Eingriffs	Rechnungsnummer

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

5.2. Inguinalhernie (exkl. beidseitiger Eingriff und exkl. Eingriff bei Rezidiv) (Eingriff der BAG-Liste)

Alter (Geburtstag)		Alter \leq 3 Jahre Keine obere Alterslimite
Fehlbildungen		Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und / oder Atmungssystem
Kardiale Erkrankungen		Herzinsuffizienz NYHA > II Schwer einstellbare arterielle Hypertonie
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		OSAS mit $\text{AHI} \geq 15/\text{h}$ und zuhause kein CPAP möglich
		COPD > GOLD II
		Asthma instabil oder exazerbiert Langzeit-Sauerstofftherapie
Gerinnungsstörungen		Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen Therapeutische Antikoagulation
Blutverdünnung		Duale Tc-Aggregationshemmung
Metabolische Erkrankungen		Diabetes mellitus schwer einstellbar, instabil
		Adipositas ($\text{BMI} \geq 40 \text{ kg/qm}$, bei Kindern $>97.$ Perzentile)
		Erwachsene: $\text{BMI} < 17.5$; bei Kindern PYMS-Score ≥ 3 und Definition der Stadien der Mangelernährung gemäss Kodierungshandbuch (2) Schwere Stoffwechselstörungen
Niereninsuffizienz		CKD > 3
Psychische Störungen		Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen
		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen
Soziale Faktoren		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ
		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi
		Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin
		Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung Relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin / dem Patienten
Eingriffsspezifische Kriterien		Beidseitige Intervention
		Eingriff bei Rezidivhernie
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik		Patientin / Patient	
Name, Vorname		Name, Vorname	
E-Mail-Adresse		Geburtsdatum	
Telefonnummer		Datums des Eingriffs	
		Rechnungsnummer	

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

5.3. Zirkumzision

Alter (Geburtstag)		Alter \leq 3 Jahre
Kardiale Erkrankungen		Herzinsuffizienz NYHA > II
		Unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		OSAS mit AHI \geq 15/h und zuhause kein CPAP möglich
		COPD > GOLD II
		Asthma instabil oder exazerbiert
Gerinnungsstörungen		Entgleiste Gerinnungsstörungen
		Therapeutische Antikoagulation
Blutverdünnung		Duale Tc-Aggregationshemmung
Neurologische Erkrankungen		Demenz resp. MMS \leq 26 Punkte, Uhrentest \leq 5 Punkte
Metabolische Erkrankungen		Diabetes mellitus mit BZ kap. perioperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8%
		Adipositas (BMI \geq 40 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)
		Mangelernährung / Kachexie (BMI < 17.5, bei Kindern < 3. Perzentile)
Niereninsuffizienz		Kreatinin-Clearance nach Cockcroft < 30 ml/min
Kontrastmittelallergie		Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium.
Psychische Störungen		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen
Soziale Faktoren		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ
		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi
		Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik		Patientin / Patient	
Name, Vorname		Name, Vorname	
E-Mail-Adresse		Geburtsdatum	
Telefonnummer		Datums des Eingriffs	
		Rechnungsnummer	

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

6. Gynäkologie

6.1. Eingriffe an der Zervix (Eingriff der BAG-Liste)

Alter (Geburtstag)		<i>Alter ≤ 3 Jahre Keine obere Alterslimite</i>
Fehlbildungen		<i>Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und / oder Atmungssystem</i>
Kardiale Erkrankungen		<i>Herzinsuffizienz NYHA > II Schwer einstellbare arterielle Hypertonie</i>
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		<i>OSAS mit AHI ≥ 15/h und zuhause kein CPAP möglich</i>
		<i>COPD > GOLD II</i>
		<i>Asthma instabil oder exazerbiert Langzeit-Sauerstofftherapie</i>
Gerinnungsstörungen		<i>Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen</i>
		<i>Therapeutische Antikoagulation</i>
Blutverdünnung		<i>Duale Tc-Aggregationshemmung</i>
Metabolische Erkrankungen		<i>Diabetes mellitus schwer einstellbar, instabil</i>
		<i>Adipositas (BMI ≥ 40 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)</i>
		<i>Erwachsene: BMI < 17.5; bei Kindern PYMS-Score ≥ 3 und Definition der Stadien der Mangelernährung gemäss Kodierungshandbuch (2) Schwere Stoffwechselstörungen</i>
Niereninsuffizienz		<i>CKD > 3</i>
Psychische Störungen		<i>Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen</i>
		<i>Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen</i>
Soziale Faktoren		<i>Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ</i>
		<i>Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi</i>
		<i>Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin</i>
		<i>Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung Relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin / dem Patienten</i>
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik			
Ärztin / Arzt	Name, Vorname	Patientin / Patient	Name, Vorname
	E-Mail-Adresse		Geburtsdatum
	Telefonnummer		Datums des Eingriffs
			Rechnungsnummer

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

6.2. Eingriffe am Uterus (Eingriff der BAG-Liste)

Alter (Geburtstag)		<i>Alter ≤ 3 Jahre Keine obere Alterslimite</i>
Fehlbildungen		<i>Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und / oder Atmungssystem</i>
Kardiale Erkrankungen		<i>Herzinsuffizienz NYHA > II Schwer einstellbare arterielle Hypertonie</i>
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		<i>OSAS mit AHI ≥ 15/h und zuhause kein CPAP möglich</i>
		<i>COPD > GOLD II</i>
		<i>Asthma instabil oder exazerbiert Langzeit-Sauerstofftherapie</i>
Gerinnungsstörungen		<i>Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen Therapeutische Antikoagulation</i>
Blutverdünnung		<i>Duale Tc-Aggregationshemmung</i>
Metabolische Erkrankungen		<i>Diabetes mellitus schwer einstellbar, instabil</i>
		<i>Adipositas (BMI ≥ 40 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)</i>
		<i>Erwachsene: BMI < 17.5; bei Kindern PYMS-Score ≥ 3 und Definition der Stadien der Mangelernährung gemäss Kodierungshandbuch (2) Schwere Stoffwechselstörungen</i>
Niereninsuffizienz		<i>CKD >3</i>
Psychische Störungen		<i>Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen</i>
		<i>Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen</i>
Soziale Faktoren		<i>Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ</i>
		<i>Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi</i>
		<i>Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin</i>
		<i>Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung Relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin / dem Patienten</i>
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik		Patientin / Patient	
Name, Vorname		Name, Vorname	
E-Mail-Adresse		Geburtsdatum	
Telefonnummer		Datums des Eingriffs	
		Rechnungsnummer	

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

7. Urologie

7.1. Extrakorporelle Stosswellenlithotripsie (ESWL)

Alter (Geburtstag)		Unter 16 oder über 75 Jahre
Kardiale Erkrankungen		Herzinsuffizienz NYHA > II
		Unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		OSAS mit AHI \geq 15/h und zuhause kein CPAP möglich
		COPD > GOLD II
		Asthma instabil oder exazerbiert
Gerinnungsstörungen		Entgleiste Gerinnungsstörungen
		Therapeutische Antikoagulation
Blutverdünnung		Duale Tc-Aggregationshemmung
Neurologische Erkrankungen		Demenz resp. MMS \leq 26 Punkte, Uhrentest \leq 5 Punkte
Metabolische Erkrankungen		Diabetes mellitus mit BZ kap. perioperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8%
		Adipositas (BMI > 30 kg/qm)
		Mangelernährung / Kachexie (BMI < 18.5)
Niereninsuffizienz		Kreatinin-Clearance nach Cockcroft < 30 ml/min
Kontrastmittelallergie		Nach der ersten komplikationslosen Exposition entfällt dieses Kriterium.
Psychische Störungen		Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen
Soziale Faktoren		Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ
		Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi
		Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin
Eingriffsspezifische Kriterien		Infektsteine (Stein bei obstruierender Pyelonephritis oder bei rezidivierenden positiven Urinkulturen mit gleichem Keim)
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		



Spital / Klinik			
Ärztin / Arzt	Name, Vorname	Patientin / Patient	Name, Vorname
	E-Mail-Adresse	Geburtsdatum	
	Telefonnummer	Datums des Eingriffs	
		Rechnungsnummer	

Kategorie	„X“ falls zutreffend	Kriterien für eine stationäre Behandlung (Gültig in BS ab 1.1.2021, BL ab 1.3.2021; Version 1.3)
-----------	----------------------	---

8. HNO

8.1. Tonsillotomie und Adenoidektomie (Eingriff der BAG-Liste)

Alter (Geburtstag)		<i>Alter ≤ 3 Jahre Keine obere Alterslimite</i>
Fehlbildungen		<i>Angeborene Fehlbildungen am Herz-Kreislauf- und / oder Atmungssystem</i>
Kardiale Erkrankungen		<i>Herzinsuffizienz NYHA > II Schwer einstellbare arterielle Hypertonie</i>
Pulmonale Erkrankungen (bei Allgemein-anästhesie)		<i>OSAS mit $AHI \geq 15/h$ und zuhause kein CPAP möglich</i>
		<i>COPD > GOLD II</i>
		<i>Asthma instabil oder exazerbiert Langzeit-Sauerstofftherapie</i>
Gerinnungsstörungen		<i>Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen</i>
		<i>Therapeutische Antikoagulation</i>
Blutverdünnung		<i>Duale Tc-Aggregationshemmung</i>
Metabolische Erkrankungen		<i>Diabetes mellitus schwer einstellbar, instabil</i>
		<i>Adipositas (BMI ≥ 40 kg/qm, bei Kindern > 97. Perzentile)</i>
		<i>Erwachsene: BMI < 17.5; bei Kindern PYMS-Score ≥ 3 und Definition der Stadien der Mangelernährung gemäss Kodierungshandbuch (2) Schwere Stoffwechselstörungen</i>
Niereninsuffizienz		<i>CKD > 3</i>
Psychische Störungen		<i>Suchterkrankung (Alkohol, Arzneimittel, Drogen), mit Komplikationen</i>
		<i>Schwere instabile psychische Störungen, die die Therapietreue bei ambulanter Nachsorge verunmöglichen</i>
Soziale Faktoren		<i>Keine kompetente erwachsene Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten 24 Stunden postoperativ</i>
		<i>Keine Transportmöglichkeit nach Hause postoperativ oder zurück in ein Spital, inkl. Taxi</i>
		<i>Anfahrtszeit > 60 Min. in ein Spital mit 24h-Notfall und entsprechender Disziplin</i>
		<i>Notwendigkeit für ständige Beaufsichtigung Relevante Verständigungsprobleme mit der Patientin / dem Patienten</i>
Freifeld für eine alternative Begründung einer stationären Behandlung		